

LICHEN SCLEROSUS

R. Filotico, V. Mastrandrea, V. Altamura

U.O.C. di Dermatologia – P.O. “A. Perrino” di Brindisi

Il “Lichen sclerosus” è una dermatosi cronica ad etiologia sconosciuta caratterizzata dalla comparsa di lesioni di colorito biancastro su tutto l’ambito cutaneo, con particolare predilezione per le pseudo mucose genitali, la zona perianale e perineale. E’ presente nell’elenco delle malattie rare della pelle, anche se la sua osservazione è tutt’altro che infrequente. Può presentarsi sia in età adulta che in età pediatrica con diversi aspetti evolutivi. La sclerosi che si determina a livello dei genitali nelle fasi avanzate di malattia provoca, fra le altre conseguenze, fimosi serrata, stenosi del canale uretrale esterno e alterazioni della normale anatomia della vulva a cui si associano deficit funzionali. Come per altre patologie infiammatorie croniche ad evoluzione atrofico-cicatrizziale, le lesioni del lichen sclerosus sono considerate sedi di possibile trasformazione neoplastica. La terapia è prevalentemente basata sull’uso di steroidi topici ad alta potenza e di topici emollienti. Nelle fasi avanzate, laddove si sono determinati fenomeni stenotici, è necessaria una terapia chirurgica.