

LE “LESIONI ROSSE IN ETÀ NEONATALE”: CLASSIFICAZIONE

C. **Ocella**

Unità Operativa Complessa di Dermatologia
Istituto Scientifico Giannina Gaslini Genova

Le lesioni rosse della cute comprendono in età neonatale svariate anomalie o proliferazioni dei vasi superficiali della cute per lo più congenite; apparentemente esse possono sembrare omogenee almeno nei primi giorni, settimane o mesi di vita; successivamente assumono una loro più precisa connotazione differenziandosi così le lesioni temporanee (es: angioma flammeo mediano) da quelle permanenti (es: malformazioni vascolari laterali propriamente dette); queste spesso costituiscono solamente un problema estetico (macchia di vino semplice), ma talvolta sottendono anche notevoli problematiche cliniche (malformazioni vascolari complesse, malformazioni artero-venose).

Solamente un completo esame obiettivo (visione, palpazione, ascoltazione) delle lesioni, l'attenta osservazione del divenire clinico e l'utilizzo di opportune metodologie diagnostiche strumentali consentono nei casi dubbi una corretta diagnosi.

Un inquadramento preciso della problematica ci consente di:

- Informare correttamente i genitori sulla natura e su decorso della lesione
- Eseguire gli accertamenti strumentali più complessi solo se e quando necessario
- Prevenire eventuali complicanze locali e generali
- Instaurare l'eventuale trattamento specifico